lüe 1°.
lue 2°.

observation sur une fracture de la rotule en travers.

n.° 8.

on a lû dans la seance du 4 may dernier, plusieurs observations envoyé par un chirurgien de rouen au sujet de la fracture en travers de la rotule, par lesquels l'observateur fait voir que malgré les precautions prises pour la reduction de l'os fracturé, il fait voir une impossibilité de reüssir malgré la sagacité du chirurgien, ce qui ne doit pas estre pris pour un precepte dans la curation de pareille maladie. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ainsi que je vais le faire voir dans l'observation presente.

Le 2 mars 1751, un particulier agée de 40 ans environ, homme fort et robuste faisant effort pour lever une salomde, le pied luy manqua et tomba sur l'extremité d'un morçeau de bois qui fractura la rotule transversalement. je fut sur le champ appellé, aprés avoir examiné la maladie, je trouvay la rotule fracturé en travers eloigné d'un bon poulce, la fracture reconnue et l'appareil disposé, je proceday a la reduction accompagné de feu m.r genti mon confrere que j'avois prié de venir avec moy. les pieces fracturés furent maintenües par le moyen d'une double compresse fendües par les deux extremités que je posay par dessous et fit venir les extremités par dessus tant en haut qu'en bas, embrassant totalement la circonference trempé dans un defensif composé de blanc d'oeuf battu et eau de vie; j'appliquay sur la partie supe-

ARC 31 d.5 n° 97
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

=rieure d'un carton assez fort echancré en forme de croissant —
enveloppé de linge le tout trempé dans le meme defensif, pour —
plus facilement se mouler a la partie assujeti par une bande —
assez longue, apres avoir fait plusieurs circulaires au dessus —
de l'os fracturé, je placay deux longuettes une de chaque costé —
plus anterieurement que posterieurement rassujeti de nou—
veau par la meme bande, les tours de bande fini, j'en fis —
autant a la partie inferieure avec cette difference qu'apres —
avoir fait plusieurs tours de bande circulairement je —
pris les longuettes en les tirant le plus qu'il me fut possible
pour les engager et assujetir par le reste de la bande. j'appli—
quay ensuite une troisieme bande plus longue en maniere —
de huit de chifre pour maintenir le tout et assujetie par —
des fanons et faux fanons en observant les conditions —
d'une bonne situation pour faciliter le retour des li—
queurs. apres avoir laissé reposer le malade une couple —
d'heures, il fut saigné autant qu'il fut de besoin. comme —
le malade estoit entesté je ne pû luy prescrire un regime
exact, ce qui ne m'inquieta pas ne voyant arriver aucuns —
accidens, j'eust attention d'examiner tous les jours ce qui —
se passoit, le premier appareil fut levé ~~au~~ le neuvieme —
jour, a l'aspect je ree lieu d'estre satisfait, je leur appliqué
de meme ce qui fut executé jusqu'a cinq fois, ayant soin
d'imbiber la partie avec le vin et l'eau de vie pour tenir

le bandage un peu plus ferme, ce qui reussit si bien que
le malade se leva en notre absence et contre ma volonté
au bout d'un mois environ et commencea a marcher le
trente sixieme jour et fut des jesuites de la rue st. jacques
a la porte montmartre, ayant defait tout l'appareil
mais pour avoir voulu trop se presser, malgré les repre
sentations que je luy faisois, il en fut la dupe car le 28.e
avril de la meme année il se la fractura de nouveau en
descendant un escalier le soir au college d'harcourt, il se
laissa tomber et sa jambe fut engagée sous son corps, le cal
ayant causé un peu de roideur dans la partie ne pouvant
pas bien plier la jambe cela obligea l'os de se separer de
nouveau, il fut ammené chez luy et fut pansé de la
meme maniere que la premiere fois avec cette difference
qu'il fut plus circonspect et garda son lit plus long temps.
les os n'ayant pû s'approcher d'assez pres le suc osseux s'est
prolongé d'un bout a l'autre et a augmenté la longueur de la
rotule qui s'est tres bien reuni comme on le peut voir par
l'examen que l'on peut faire du malade, m.rs genti et silvie
l'ont vû dans les differents pansemens, mais la preuve la
plus convaincante est le 3.e accident qui luy est arrivé.

Le 11.e novembre de la meme année, venant de se promener
de la guinguette sans canne ny baton par un temps pluvieux

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

et le soir, il se laissa tomber a la renverse la jambe sous le corps
comme les cals etoient fort solides ils resisterent a l'effort
mais le ligament qui l'attache au tibia fut rompû pres de
son attache inferieure; malgré toutes les precautions que
j'ay prise, je n'ay pû parvenir a en procurer la reunion
laissant un intervale d'un demie travers de doigt, ce qui fait
que la rotule est plus haute que l'autre, les mouvements de
la jambe sont tres libres a la reserve de la foiblesse. le
malade marche sans feindre ny boueter. on sent que la
capsule s'est fortifiée et qu'elle supplée au defaut de
ligament. // Chappillon